



## Taxus baccata 'Overeynderi'



<b>Altura</b>	3-4 m
<b>Anchura</b>	2-3m
<b>Copa</b>	ovoid / egg-shaped, dark, dense crown
<b>Corteza y ramas</b>	flaking, reddish brown
<b>hoja</b>	green, evergreen
<b>Flores</b>	yellow, flowers in April
<b>Frutos</b>	fruitless cultivar
<b>Espinas/púas</b>	Ninguno
<b>Toxicidad</b>	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
<b>Tipo de suelo</b>	clayed soil, loamy soil, sandy soil, acid soil, calcareous soil
<b>Requisitos de colocación</b>	No soporta el pavimento
<b>resistencia a las heladas</b>	6b (-20,5 a -17,8 °C)
<b>Resistencia al viento</b>	good
<b>Otras resistencias</b>	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
<b>Árboles beneficiosos para la fauna</b>	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol nutritivo para pájaros
<b>Aplicación</b>	árbol en cubo, jardines de azotea, zona industrial, pequeño jardín
<b>Forma</b>	conífera solitaria

Cultivar bueno y de crecimiento amplio con una copa ovoide regular hasta una altura de 3 a 4 m. Este Taxus está muy densamente ramificado con ramas marrones. La corteza vieja es marrón-rojiza y se desprende. Las acículas, de unos 2 cm de longitud, son relativamente cortas. Tienen unos 0,2 cm de ancho y son de color verde medio. Aunque el 'Overeynderi' suele florecer profusamente, la floración es masculina, por lo que no se forman frutos. El árbol es algo parecido al 'Major' y al 'Pyramidalis', pero tiene una ramificación más densa y una forma de copa más regular. Muy adecuado para parques y jardines y también como seto. Se originó en 1923 como esqueje de 'Fastigiata'.