



## Pterostyrax corymbosa



<b>Altura</b>	10 - 15 m
<b>Anchura</b>	10-15m
<b>Copa</b>	oval, half-open crown
<b>Corteza y ramas</b>	branches gray to gray brown: bark grey-brown, grooved
<b>hoja</b>	obovate to oval, 6-14 cm long, glossy green
<b>Flores</b>	in panicles, 3-6 cm long, flowers approx. 1 cm large, white, June
<b>Frutos</b>	drupe, obovate, 1.2-2.2 cm, densely hairy
<b>Espinas/púas</b>	Ninguno
<b>Toxicidad</b>	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
<b>Tipo de suelo</b>	clayed soil, loamy soil, sandy soil, calcareous soil
<b>Requisitos de colocación</b>	No soporta el pavimento
<b>resistencia a las heladas</b>	7a (-17,7 a -15,0 °C)
<b>Resistencia al viento</b>	not good
<b>Árboles beneficiosos para la fauna</b>	árboles apícolas
<b>Forma</b>	árbol de tronco alto, árbol multi tronco

Pterostyrax corymbosus es un árbol de tamaño medio que puede alcanzar los 10-15 m de altura. Su amplia copa tiene forma de abanico a redondeada y, debido a sus hojas bastante grandes, es densa. Las ramas son de color gris a marrón grisáceo, al igual que la corteza más vieja, ligeramente estriada. Las ramas son bastante quebradizas, por lo que se rompen fácilmente con vientos (muy) fuertes. Las hojas, bastante grandes y lustrosas, tienen un tacto algo pastoso. Las hojas maduras son glabras en el haz y vellosas en el envés. Las flores blancas aparecen en panículas anchas de hasta 6 cm de largo y se abren en junio, un poco antes que las flores de *P. hispidus*. Las flores individuales miden aproximadamente 1 cm y tienen una agradable fragancia. Son polinizadas abundantemente por las abejas. Los frutos de *P. corymbosus* miden unos 2 cm y son densamente vellosos, lo que los diferencia notablemente de las demás especies de *Pterostyrax*. *Pterostyrax corymbosus* crece en cualquier tipo de suelo, siempre que esté suficientemente húmedo. También tolera bien los suelos más ácidos o calcáreos. El árbol tolera mal la sequía prolongada. Naturalmente, el *P. corymbosus* crece en laderas montañosas húmedas y sombreadas y a lo largo de arroyos y ríos en el suroeste de China y Japón.

El *P. corymbosus*