



## Styrax obassia



<b>Altura</b>	10 - 15 m
<b>Anchura</b>	5-8m
<b>Copa</b>	broad ovoid to round, half-open crown, capricious growing
<b>Corteza y ramas</b>	twigs reddish brown, bark grey, smooth
<b>hoja</b>	broad oval to round, dark green, 5 - 20 cm
<b>Flores</b>	in racemes, 10 - 20 cm, white with yellow stamens, approx. 2 cm, June, fragrant flowers
<b>Frutos</b>	ovoid drupe, white to yellowish, hairy
<b>Espinas/púas</b>	Ninguno
<b>Toxicidad</b>	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
<b>Tipo de suelo</b>	light loamy and humic soil
<b>Requisitos de colocación</b>	No soporta el pavimento
<b>resistencia a las heladas</b>	6b (-20,5 a -17,8 °C)
<b>Resistencia al viento</b>	moderate
<b>Otras resistencias</b>	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6)
<b>Árboles beneficiosos para la fauna</b>	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), árbol nutritivo para pájaros
<b>Forma</b>	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
<b>Origen</b>	Japan, Korea, Northern China

Arbusto muy grande o árbol de tamaño medio a grande con una copa ancha de ovoide a redonda. Las ramitas jóvenes son de color marrón rojizo, inicialmente vellosas, más tarde de color púrpura oscuro y de desnudas a ligeramente escamosas. La corteza de los árboles más viejos es gris y lisa. Las hojas son grandes, casi redondas, con la punta visiblemente puntiaguda. Son de color verde oscuro. Las dos hojas inferiores de cada brote están casi opuestas. Las hojas restantes están dispersas a lo largo de la ramita. La base de las hojas es ensanchada, cóncava y encierra el brote. Las flores se abren en junio y cuelgan en largos racimos. Las flores individuales miden unos 2 cm y son blancas con estambres amarillos. Tienen un aroma muy fuerte y agradable. El árbol suele florecer muy profusamente y entonces se ve muy favorecido por las abejas. Las flores van seguidas de drupas duras, en forma de huevo, de color blanco a amarillento con un cáliz verde oscuro.