



Celtis occidentalis



Altura	8 - 15 (30) m
Anchura	6-12m
Copa	round, irregular , half-open crown, capricious growing
Corteza y ramas	grey, irregularly corky-winged
hoja	ovate-lanceolate, green, 7 - 15 cm
Tono otoñal	amarillo
Flores	inconspicuous, green, April/May
Frutos	round stone fruit, purple black, Ø circa 1 cm
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	few requirements
Humedad del suelo	Se puede plantar en suelos áridos
Requisitos de colocación	Soporta el pavimento
resistencia a las heladas	4 (-34,4 a -28,9 °C)
Resistencia al viento	slightly susceptible
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6)
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), árbol huésped para mariposas
Aplicación	avenidas y calles anchas, zona industrial
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	central and eastern part of North America

Árbol de copa irregular originario de Norteamérica. En algunos lugares se pueden encontrar ejemplares que superan los 20 m, a veces 30 m. Se ramifica bastante bajo, formando a veces un árbol de varios tallos con muchas ramitas fuertemente caídas. El tronco es dentado, con profundas muescas y muchas protuberancias. Las hojas son oblongo-ovoides, largamente puntiagudas y de color verde brillante. El envés es más apagado. La mitad superior del borde de la hoja está fuertemente dentada y ambas caras de la hoja son ásperas. En otoño adquiere un llamativo color amarillo dorado. Tras una floración discreta, aparecen pequeñas drupas que pasan del naranja al negro púrpura. Éstas pueden permanecer en el árbol todo el invierno. La madera es valiosa y las ramitas jóvenes y flexibles se utilizaban antiguamente como látigos.