



## Cornus controversa



<b>Altura</b>	6 – 8 (15) m
<b>Anchura</b>	6-8m
<b>Copa</b>	round, branching in layers, half-open crown, capricious growing
<b>Corteza y ramas</b>	green brown with shallow veins
<b>hoja</b>	wide ovate to wide oval, green, 8 – 15 cm
<b>Tono otoñal</b>	rojo, púrpura
<b>Flores</b>	cream white, in umbel clusters, May/June
<b>Frutos</b>	small dark-blue berry
<b>Espinas/púas</b>	Ninguno
<b>Toxicidad</b>	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
<b>Tipo de suelo</b>	all, if well-drained, no dry sandy soil
<b>Requisitos de colocación</b>	No soporta el pavimento
<b>resistencia a las heladas</b>	6b (-20,5 a -17,8 °C)
<b>Resistencia al viento</b>	good
<b>Otras resistencias</b>	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
<b>Árboles beneficiosos para la fauna</b>	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol nutritivo para pájaros
<b>Aplicación</b>	árbol en cubo, pequeño jardín, jardines interiores
<b>Forma</b>	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
<b>Origen</b>	Japan, Korea, China

Pequeño árbol cuya principal característica es su ramificación horizontal, creciendo en hileras. En su área de distribución natural, a veces alcanza los 15 m de altura. La copa puede ser tan ancha como alta. El color de las ramitas va del marrón rojizo al gris. Las hojas alternas son irregulares en forma y tamaño y tienen un color verde oscuro brillante. El envés es de un llamativo verde azulado. En otoño se vuelve rojo púrpura. Los corimbos florales en forma de umbela pueden alcanzar unos 15 cm de diámetro. Surgen de tallos cortos y se disponen a lo largo de ramas horizontales. En otoño aparecen numerosas bayas de color azul oscuro. En los Países Bajos, la fructificación es muy variable y, desde luego, no está garantizada. Enraíza superficialmente con un sistema radicular fino. Debido al temprano flujo de savia en primavera, la poda debe realizarse en verano u otoño.