




Pyrus calleryana 'Redspire'



Altura	8 - 12 m
Anchura	6-8m
Copa	narrow pyramidal to oval, half-open crown
Corteza y ramas	greyish brown, shallow grooves, sharp, thorny twigs
hoja	oval to broad oval, glossy green, 4 - 10 cm
Tono otoñal	amarillo, rojo, púrpura
Flores	white, in plentiful umbels, April/May
Frutos	round, approx. 1 cm Ø, brown with lighter lenticels
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	places little demands
Requisitos de colocación	Soporta el pavimento
resistencia a las heladas	5b (-26,0 a -23,4 °C)
Resistencia al viento	good, also on the coast
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árboles apícolas
Aplicación	avenidas y calles anchas, calles estrechas, árbol en cubo, jardines de azotea, cúbico, zona industrial, pequeño jardín
Forma	árbol de tronco alto
Origen	Princeton Nurseries, Princeton, New Jersey, USA, 1975

Cultivar americano de copa estrecha y erguida, de cónica a ovalada. Es ligeramente más estrecho que el "Chanticleer". Altura de 8 a 12 m. El porte es compacto. La corteza vieja se vuelve áspera y gris-marrón. Las hojas verdes, sanas y brillantes, tienen un atractivo color otoñal, principalmente amarillo, pero también rojo púrpura. Permanecen en el árbol hasta finales de otoño. La floración es profusa. Las flores blancas se disponen de 6 a 12 juntas en corimbos. Cada flor tiene un diámetro de unos 2,5 cm, por lo que es algo mayor que la flor de 'Bradford', por ejemplo. Los frutos son marrones con lenticelas más claras y aparecen con poca frecuencia. Adecuada como solitaria y para plantar en callejuelas y calles estrechas. De raíces profundas. Prefiere suelos neutros a ligeramente calcáreos. También crece en suelos pobres. Muy resistente a la contaminación atmosférica.