




Quercus robur 'Purpurascens'



| | |
|----------------------------------|--|
| Altura | 15 m |
| Anchura | 10-12m |
| Copa | round, half-open crown |
| Corteza y ramas | dark grey, deep grooves, twigs reddish-brown |
| hoja | obovate, lobed, dark purplish-brown, 5 - 14 cm |
| Flores | greenish-yellow catkins, 2 - 4 cm long, May |
| Frutos | ovoid to oval acorn, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 to 6 |
| Espinas/púas | Ninguno |
| Toxicidad | no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado |
| Tipo de suelo | nutritious and moist |
| Humedad del suelo | Se puede plantar en suelos húmedos |
| Requisitos de colocación | No soporta el pavimento |
| resistencia a las heladas | 5a (-28,8 a -26,1 °C) |
| Resistencia al viento | good |
| Otras resistencias | resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, resistencia a sal antihielo |
| Aplicación | zona industrial |
| Forma | árbol de tronco alto, árbol multi tronco |
| Origen | France, 1808 |

Cultivar de hoja roja de Q. robur con hábito de ramificación en ángulo. La copa es redondeada y la altura de unos 15 m. El tronco suele ser poco ramificado y la corteza gris oscura, estriada en los ejemplares viejos. Las ramas jóvenes son de color marrón rojizo. Las hojas variables son de inversamente ovadas a largamente ovales, de 5 - 14 cm de largo y 4 - 8 cm de ancho. Tiene de 3 a 6 pares de lóbulos obtusos y brota de un llamativo color marrón púrpura oscuro en primavera. Más tarde, se vuelve verde púrpura oscuro. La cerradura de San Juan (que aparece después del 21 de junio) es también de un llamativo rojo parduzco. Las bellotas ovoides son de 2 a 6 juntas y están encerradas a lo sumo un tercio por la copa, que está cubierta de pequeñas escamas triangulares adyacentes. El 'Purpurascens' es adecuado para plantaciones solitarias en parques.