



Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'



Altura	8 - 10 m
Anchura	3-5m
Copa	ovoid, half-open crown
Corteza y ramas	grey, smooth, later a little flaky
hoja	imparipinnate, approx. 20 cm long, 9 - 17 (21) leaflets, dark green, feathered leaf
Tono otoñal	naranja, rojo
Flores	in umbels, Ø approx. 15 cm, white flowers, May/June
Frutos	orange-yellow, in wide umbels, August/September
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	preferably slightly acid humic soil
Humedad del suelo	Se puede plantar en suelos áridos
Requisitos de colocación	Soporta superficies pavimentadas en parte
resistencia a las heladas	6a (-23,3 a -20,6 °C)
Resistencia al viento	good
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol nutritivo para pájaros
Aplicación	avenidas y calles anchas
Forma	árbol de tronco alto
Origen	Brouwers Boomkwekerijen B.V., Groenekan, The Netherlands, circa 1950

Este árbol forma una copa ovoide bastante densa que más tarde se vuelve más redondeada. Las hojas imparipinnadas constan de 9-17 (21) foliolos lanceolados. Miden de 5 a 7 cm de largo, de 2 a 3 cm de ancho y tienen el borde finamente dentado. El color en otoño es rojo anaranjado. Los grandes corimbos florales en forma de fieltro están compuestos por muchas flores blancas. Los frutos de color amarillo anaranjado, de aproximadamente 1 cm de diámetro, aparecen ya en agosto y permanecen en el árbol hasta mediados de septiembre. La fructificación es menos numerosa que en otros cultivares. El "Schouten" prefiere suelos ricos en humus ligeramente ácidos, pero también prospera en suelos arenosos secos. El árbol se encontró en un lote de plántones de *S. discolor* alrededor de 1950. Más tarde se descubrió que 'Schouten' pertenecía al híbrido *S. x arnoldiana*.