



## Koelreuteria bipinnata



|   |  |
|---|--|
| <b>Altura</b>                             | 9-12 m   |
| <b>Anchura</b>                            | 7-10m  |
| <b>Copa</b>                               | irregularly round  |
| <b>Corteza y ramas</b>                    | twigs dark brown, bark grey-brown, slightly grooved                        |
| <b>hoja</b>                               | double to triple pinnate, up to 50 cm long, leaves smooth-edged            |
| <b>Tono otoñal</b>                        | amarillo   |
| <b>Flores</b>                             | yellow, in large terminal panicles up to 30 (50) cm long, August-September |
| <b>Frutos</b>                             | vesicular, pink to pink-red  |
| <b>Espinas/púas</b>                       | Ninguno  |
| <b>Toxicidad</b>                          | no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado  |
| <b>Tipo de suelo</b>                      | makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions            |
| <b>Humedad del suelo</b>                  | Se puede plantar en suelos áridos  |
| <b>Requisitos de colocación</b>           | No soporta el pavimento  |
| <b>resistencia a las heladas</b>          | 7 (-17,7 a -12,3 °C)   |
| <b>Resistencia al viento</b>              | moderate   |
| <b>Árboles beneficiosos para la fauna</b> | árbol huésped para mariposas   |
| <b>Aplicación</b>                         | árbol en cubo, jardines de azotea  |
| <b>Forma</b>                              | árbol de tronco alto, árbol multi tronco                                   |

A primera vista, la *Koelreuteria bipinnata* se parece mucho a la más conocida *K. paniculata*. Sin embargo, existen las diferencias necesarias. Las ramitas anuales de la *K. bipinnata* son hasta tres veces más gruesas que las de la *K. paniculata*. Además, las hojas compuestas son pinnadas dobles o triples, mientras que en la *K. paniculata* son pinnadas o a veces dobles. En *K. bipinnata* las hojas no son lobuladas. Una diferencia importante también se muestra después de la floración; los frutos en forma de vejiga de la *K. bipinnata* son de un hermoso color rosa a rojo rosado. Desgraciadamente, esta especie también puede propagarse con facilidad, sobre todo en lugares más cálidos. El árbol forma una copa irregularmente redondeada que más tarde se hunde ligeramente. Esto hace que el *K. bipinnata* sea casi inadecuado como árbol de avenida. Aparte de que no tolera la pavimentación. Gracias a su buena tolerancia a la sequía y al calor, el árbol se da bien como solitario en lugares soleados. Además, las flores atraen a muchas abejas.

El